




Kass pissib valesti?

UURI VÄLJA, MIKS



KASS ON PUHAS LOOM ja teda on lemmikuna lihtne pidada. Kassipoega ei ole vaja eraldi õpetada liivakasti kasutama, kuna ta järgib ema eeskujuga ja tutvub liivakastiga kohe, kui õpib liikuma. Sobivas loovutuseas (soovituslikult alates 12. elunädalast) uude koju minev kassipoeg teab tavaliselt liivakasti otstarvet väga hästi. Reeglina harjub kass hästi ka kasutuses oleva liivatüübiga.

MÕNIKORD VÕIB SIISKI JUHTUDA, et varem korralikult liivakasti kasutanud kass hakkab urineerima ka mujale. Selle põhjuseks võib olla stress või haigus. Kui kass hakkab märgistama, tasub põhjus välja selgitada võimalikult kiiresti, et see komme ei saaks harjumuseks.

SELLES BROŠÜÜRIS RÄÄGITAKSE lühidalt kasside tavalisematest kuseteede haigustest ja stressitekitajatest, mis võivad valesse kohta urineerimist põhjustada. Brošüüris antakse ka näpunäiteid, kuidas kassi stressi on võimalik leevendada.

KASSI KUSETEEDE PROBLEEME ESINEB PÄRIS SAGELI. SEETÖTTU TULEKS ALATI TEHA LOOMA-KLIINIKUS URIINIANALÜÜS.

Kui kassil on kuseteede haigus, seostab ta urineerides tuntuva valu liivakastiga ja üritab mujale pissides valu vältida.

Muu koht võib sageli olla midagi pehmet – diivan, voodi või vaip. Valesti urineerimised ei pruugi toimuda sageli, vahe võib olla isegi nädalaid. Mõned kassid on aga valu varjamises meistrid.

Kuseteede haiguse all kannataval kassil võib olla üks või mitu järgmistest haigustunnustest: valesse kohta urineerimine, muutunud käitumine, sagenenud urineerimine, vähene uriinikogus, võimetus urineerida, suguelundite lakkumine, kauem urineerimisasendi võtmine, valulik või vaevarikas urineerimine, punaka värvusega uriin, söögiisu vähenemine. »

TAVALISEMAD KUSETEEDE HAIGUSED:

IDIOPAATILINE TSÜSTIIT on valuliku põie sündroom, mida esineb ka inimestel. Sümptomite esinemine on tugevalt seotud stressiga. Pöiest kiirgav valu võib põhjustada järgmisi sümptomeid: veri uriinis, korduv urineerimine või selle üritamine, suutmatuse urineerida, häälitsemine urineerides ja valedesse kohtadesse urineerimine. Idiopaatilise tsüstiidi puhul on tähtsaks raviviisiks valuvaigistus ja võimalike stressitekitajate eemaldamine kassi elust.

PÕIEKRISTALLID JA -KIVID. Osadel kassidel on soodumus uriinis kristalliseerumiseks põies ja põieliiva ning -kivide tekkeks. Kui siis kusejuhad täielikult ummistuvad, võib olukord olla loomale eluohtlik. Toiduvalik võib mõjutada kristallide ja põiekivide tekkimist.

PÕLETIKUD. Kuseteede põletik on tavaliselt põhjustatud kolibakteritest. Kolibakter liigub soolestikust kuseteedesse, eriti kõhukinnisuse all kannatavatel eakamatel kassidel. Bakterid lõhuvad põie limaskestast, mis põhjustab valu. Lisaks põiele on vaja ravida ka kõhukinnisust. Kuseteede põletikku võib haigestuda ka noor kass.

STRESS JA VALED WC-HARJUMUSED

Kui loomaarsti tehtud uuringutega ei leita valesti urineerivalt kassilt füüsilist viga – kehalist probleemi, võivad järgmised punktid aidata mõelda kassi stressi põhjustele ja muudele võimalustele nende vähendamiseks:

SOBIMATU LIIVAKAST: Mitmed kassid eelistavad pealt lahtist liivakasti. Kinnised kastid panevad kassi tundma ennast ebaturvaliselt (puudub põgenemistee) või on liivakasti sees olev lõhn kassi arvates ebameeldiv. Liivakast peab olema piisavalt suur. Kõrgetest äärtest piisab vajalikuks kaitseks.

SOBIMATU LIIV: Kassid on isiksused, ühele sobivad erinevad liivad, samas teine talub ainult ühte sorti liiva. Kui soovid vahetada liiva sorti, lisa uut liiva natukesehaaval, nii harjub kass paremini. Liiva peab kastis alati olema piisavalt palju, et kass saaks kaevata ja peita.

MÄÄRDUNUD LIIVAKAST: Kassid on puhtuse osas nõudlikud. Liivakasti tuleb korralikult koristada iga päev, võimalikult vähe viivitades. Võib juhtuda, et kassile ei meeldi pesuvahend. See peaks olema leebe või tuleks kasutada liivakasti pesemiseks keeva vett.

LIIVAKASTI VALE ASUKOHT: Kast tuleb paigutada võimalikult kaugele kassi söögi- ja magamiskohtadest. Liivakast peab olema rahulikus ja vaiksuses kohas, kust avaneb vaade uksele. Probleeme võib esineda, kui kass tunneb ennast kastis käies ohustatuna (näiteks lapsed, koer või teised kassid võivad häirida).

LIIGA VÄHE LIIVAKASTE:

Liivakaste võiks olla sama palju kui majapidamises on kasse +1.

VANA KASS: Vananevatel kassidel võib esineda erinevaid kroonilisi liigese põletikke, näiteks osteoartriiti. Liivakasti hüppamine või urineerimis- ja roojamisasend võib põhjustada valu. Liivakasti ääred peaksid olema madalad. Olukorda võib leevendada erinevate toidulisandite ja liigeseid toetava toiduga. Vajadusel saab loomaarst määrata kassile valuvaigistit.

KASTREERIMATA VÕI STERILISEERIMATA KASS:

Uriiniga märgistamine on kassidel täiesti tavaline käitumine ja seda eriti isastel kassidel. Kassid vahetavad palju infot lõhnatähistega vahendusel, näiteks suguküpsusest. Kassi steriliseerimine lõpetab reeglina märgistamise. **NB! Ka kastreerimata või steriliseerimata kass võib kannatada kuseteede haiguse all.**

MAJAPIDAMISES ON MITU KASSI: Kui kodus on mitu kassi, võib juhtuda, et märgistamine suureneb, kuna kass soovib oma territooriumit kaitsta. Kõikidel kassidel peaks olema korteris oma rahulik magamiskoht. Väikeses korteris tasub kõik ruutmeetrid ära kasutada: peidukohti ja ronimispuud tasub rajada kuni laeni. Kassid on tundlikud muutustele, nii et kui nad on arendanud neile sobiva süsteemi, ei maksa seda ilmaasjata lõhkuda.

UUSTULNUK: Kui peresse võetakse uus kass, tuleb uut ja vana kassi korralikult tutvustada. Tutvustamise hoolikas ettevalmistus on palju lihtsam kui kasside ebakõlade tagantjärele parandamine.

Kasse ei tasu lubada samadesse ruumidesse kohe esimesel päeval, vaid uustulnukale valmistatakse ette oma tuba, kus ta saab rahulikult oma uue koduga tutvuda. Oma tempos tutvub kass muude kasside lõhnadega kergemalt, nii läheb reviiiride jagamine lihtsamini. Tutvustamist tasub alustada lõhnade vahetamisega; silita pere esimest kassi mõne riideesemega ja siis sama riidega ka uut kassi.

Uue kassi tupp peab olema ka mõne eelmise kassi asja ja vahetada esemeid toast tupp, et kassid saaksid teineteise lõhnadega tutvuda. Lõhn vahetust tuleks teha vähemalt kaks päeva enne, kui kassid kohtuvad. Nii on uuel kassil pere eelmise kassi lõhn tuttav.

Kasside vahelisi ja muid stressiolukordi võib leevendada Feliway pihusti abil, kust eraldub õhku feromoonid. Uriiniplekid tuleb hoolikalt puhastada uriini lagundava pesuvahendiga (nt Urine Off-spray), et kass ei märgistaks sama kohta uuesti.

TEKST: LOOMAARST TUIJA SALMINEN JA
ELÄINSUOJELUYHDISTYSTEN KUMMIT RY

EESTIKEELSE BROŠÜÜRI
LEIAB VEEBILEHTEL
WWW.KASSIJAAM.EU

ORIGINAALBROŠÜÜRI
LEIAB VEEBILEHTEL
WWW.ESYJENKUMMIT.NET

